

5 日 獣 発 第 384 号
令和 6 年 3 月 26 日

地方獣医師会会長 各位

公益社団法人 日本獣医師会
会 長 藏 内 勇 夫
(公印及び契印の押印は省略)

**重症熱性血小板減少症候群（SFTS）ウイルスの
患者から医療従事者への感染事例について**


このことについて、令和 6 年 3 月 19 日付け事務連絡により厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課から、別添のとおり通知がありました。

この度の通知は、本邦で初めてとなる重症熱性血小板減少症候群（SFTS）ウイルスのヒトーヒト感染（患者から医療従事者への感染）事例が確認されたため、「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に係る注意喚起について」（平成 29 年 7 月 24 日付け健感発 0724 第 1 号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）、並びに「ダニ媒介感染症の予防啓発及び対策の推進について（協力依頼）」（令和 5 年 5 月 22 日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡）について、改めて周知を求められたものです。

つきましては、貴会関係者への周知方、よろしくお願いいたします。

本件のお問合せ先

公益社団法人 日本獣医師会
事業担当：岡本、中村、松岡
TEL:03-3475-1601
E-mail: okamoto@nichiju.or.jp



事 務 連 絡
令和 6 年 3 月 19 日

公益社団法人 日本獣医師会 御中

厚生労働省健康・生活衛生局
感染症対策部感染症対策課

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）ウイルスの患者から医療従事者への感染事例について

平素より、感染症対策の推進につきまして、御理解と御協力を賜り誠にありがとうございます。

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）は、主にウイルスを保有するマダニの刺咬により感染し、感染した犬や猫の体液への直接接触による感染も報告されています。また、海外においては、ヒトからヒトへの感染事例が複数報告されています。

国内では、2013年に初めて患者が報告されて以降、ヒトからヒトへの感染は確認されていませんでしたが、今般、別添のとおり、本邦で初めてとなるSFTSウイルスのヒト→ヒト感染（患者から医療従事者への感染）事例が確認されましたので、情報提供いたします。

近年も、動物の診療等でSFTSウイルスに感染したと推定される獣医療従事者の症例が、散発的に報告されています。犬・猫等の診療における、標準感染予防策および感染経路別の予防策の徹底については、「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に係る注意喚起について」（平成29年7月24日付け健感発0724第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）により注意喚起をお願いしたところですが、改めて貴会会員に周知いただきますようよろしくお願いします。

なお、近年は、SFTS患者の発生が増加しており、発生地域についても拡大傾向がみられます。マダニの多くは、春から秋にかけて活動が活発になることから、「ダニ媒介感染症の予防啓発及び対策の推進について（協力依頼）」（令和5年5月22日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡）の内容についても、改めて貴会会員に周知いただきますよう、御配慮のほどよろしくお願いいたします。

(別添)

1. 病原微生物検出情報 (IASR) 速報 本邦で初めて確認された重症熱性血小板減少症候群のヒト-ヒト感染症例 (国立感染症研究所)
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/sfts/sfts-iasrs/12572-530p01.html>

(参考資料)

1. 「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて」(平成 30 年 12 月 27 日付け健感発 1227 第 1 号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
<https://www.mhlw.go.jp/content/000548441.pdf>
2. 「重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) 診療の手引き 改訂新版」(平成 30 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業「一類感染症等の患者発生時に備えた臨床的対応に関する研究」)
<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001229138.pdf>
3. 獣医療関係者の感染防御対策について (厚生労働省 HP)
<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000487998.pdf>
4. 「重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) に係る注意喚起について」(平成 29 年 7 月 24 日付け健感発 0724 第 1 号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000750161.pdf>
5. 「重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) の国内での発生状況について (情報提供)」(令和 3 年 3 月 8 日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)
<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000750411.pdf>
(別添) <https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000750412.pdf>
6. 「ダニ媒介感染症の予防啓発及び対策の推進について (協力依頼)」(令和 5 年 5 月 9 日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)
<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001111968.pdf>
7. 重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) について (厚生労働省 HP)
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000169522.html>
8. 重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) とは (国立感染症研究所 HP)
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/sa/sfts.html>

事 務 連 絡
令 和 6 年 3 月 19 日

各

都 道 府 県
保 健 所 設 置 市
特 別 区

 衛生主管部（局）御中

厚生労働省健康・生活衛生局
感染症対策部感染症対策課

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）ウイルスの患者から医療従事者への感染事例について

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）は、主にウイルスを保有するマダニの刺咬により感染し、感染した犬や猫の体液への直接接触による感染も報告されています。また、海外においては、ヒトからヒトへの感染事例が複数報告されています。

国内では、2013年に初めて患者が報告されて以降、ヒトからヒトへの感染は確認されていませんでしたが、今般、別添1のとおり、本邦で初めてとなるSFTSウイルスのヒト→ヒト感染（患者から医療従事者への感染）事例が確認されました。

つきましては、下記事項について、貴管内医療機関を含む関係者への周知方よろしくお願いします。

記

1. SFTS患者の診療における个人防护具（PPE）の使用については、ヒトからヒトへの感染を予防するために、厚生労働科学研究班において作成された「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）診療の手引き 改訂新版2019」（別添2）を参照の上、標準感染予防策及び感染経路別予防策を徹底すること。また、消毒・滅菌の実施にあたっては、「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて」（平成30年12月27日付け健感発1227第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）（参考資料1）を参照すること。
2. 近年、SFTS患者の報告数が増加しており、発生地域についても拡大傾向がみられる（参考資料2）。マダニの多くは、春から秋にかけて活動が活発になることから、「ダニ媒介感染症の予防啓発及び対策の推進について（協力依頼）」（令和5年5月9日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡）（参考資料3）の内容も踏まえ、SFTSを含むダニ媒介感染症の予防対策を徹底すること。

以上

(別添)

1. 病原微生物検出情報 (IASR) 速報 本邦で初めて確認された重症熱性血小板減少症候群のヒト-ヒト感染症例 (国立感染症研究所)
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/sfts/sfts-iasrs/12572-530p01.html>
2. 「重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) 診療の手引き 改訂新版」 (平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業「一類感染症等の患者発生時に備えた臨床的対応に関する研究」)
<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001229138.pdf>

(参考資料)

1. 「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて」 (平成 30 年 12 月 27 日付け健感発 1227 第 1 号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
<https://www.mhlw.go.jp/content/000548441.pdf>
2. 「重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) の国内での発生状況について (情報提供)」 (令和 3 年 3 月 8 日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)
<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000750411.pdf>
(別添) <https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000750412.pdf>
3. 「ダニ媒介感染症の予防啓発及び対策の推進について (協力依頼)」 (令和 5 年 5 月 9 日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)
<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001111968.pdf>
4. 重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) について (厚生労働省 HP)
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000169522.html>
5. 重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) とは (国立感染症研究所 HP)
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/sa/sfts.html>

【連絡先】

厚生労働省健康・生活衛生局
感染症対策部感染症対策課
TEL: 03-3595-2257 (平日)

本邦で初めて確認された重症熱性血小板減少症候群のヒト-ヒト感染症例

重症熱性血小板減少性症候群 (severe fever with thrombocytopenia syndrome : SFTS) は、SFTS ウイルス (SFTSV) により引き起こされる新興ウイルス感染症である。SFTS を発症した患者には、突然の発熱、下痢や下血といった消化器症状とともに血小板減少と白血球減少がみられ、重症例は多臓器不全に陥り死亡する。日本における致死率は 27% と高く¹⁾、現在までに SFTS に対して確立した特異的治療はない。感染経路は主にはマダニ刺咬と考えられているが、ヒトからヒトへの感染例が中国や韓国からは報告されている²⁾。2013 年に日本で初めての SFTS 患者が報告されて以来³⁾、わが国ではヒト-ヒト感染は認められていなかったが、今回我々は日本で初めてのヒト-ヒト感染例を確認したため報告する。

症例

医師 A は 20 代男性で当院に勤務していた。2023 年 4 月に、90 代男性患者が食思不振、発熱、体動困難にて当院の救急外来を受診した。医師 A はサージカルマスクを装着して患者の間診と、手袋をせずに身体診察を行ったが、患者の体液に直接触れるような診察や処置はしなかった。血液検査で白血球減少、血小板減少、LDH や肝酵素の上昇があり、SFTS が疑われて患者は緊急入院となり、医師 A は担当医となった。入院後に別医師が、キャップ、ゴーグル、サージカルマスク、ガウン、一重手袋を装着し、中心静脈カテーテルを挿入した。患者は個室管理され、医療従事者はゴーグル、サージカルマスク（または N95 マスク）、ガウン、一重手袋を着用して診療にあたった。患者は入院後翌日に SFTS と確定診断されたが、その後に意識障害やけいれんが出現して急速に全身状態が悪化し、3 日間の経過で死亡した。死後に医師 A は、サージカルマスク、ガウン、一重手袋を着用して留置していた中心静脈カテーテルを抜去し、出血が止まりにくかった抜去部の縫合処置を行った。その際にはゴーグルは着用していなかった。また、縫合処置の際の針刺し事故は生じなかった。

患者との初めての接触から 11 日後（患者死亡の 9 日後）に、医師 A は 38℃ の発熱と頭痛を自覚した。次第に関節痛、下痢、食思不振、乾性咳嗽をとまなうようになり、発症 5 日後の血液検査で SFTS を疑う異常所見（白血球 $2000 / \mu\text{L}$ 、血小板 $7.8 \times 10^4 / \mu\text{L}$ 、AST 76 IU/L、LDH 276 IU/L）がみられたことから、SFTSV の RT-PCR 検査が行われ、SFTS の確定診断に至った。経過観察のみで症状は徐々に軽快し、発症 12 日目には血液検査所見も改善した。医師 A には、SFTS 発症前にマダニに刺されるような野外活動歴はなく、ペット飼育歴もなかった。

患者および医師 A の血清検体より逆転写リアルタイム PCR で検出されたウイルスのコピー数は、それぞれ 7.2×10^6 コピー/mL、 3.9×10^2 コピー/mL であった。それぞれの SFTSV 遺伝子を、サンガー法および次世代シーケンサーを用いて配列決定し比較したところ、配列を決定し得た M segment（ウイルス相補鎖 RNA における 1382 番目から 2042 番目の 661 塩基）と S segment（ウイルス相補鎖 RNA における 389 番目から 651 番目の 263 塩基）部分においては 100% の相同性が認められた。両者の SFTSV は同一のウイルスと考えられたため、患者から医師 A へのヒト-ヒト感染事例と診断した。

なお、患者に接した他の医療従事者には、SFTS 感染を疑う症状は認めなかった。患者入院中、家族は面会時にサージカルマスク、ガウン、手袋を装着していた。病院から自宅へ遺体の搬送を行った葬儀関係者は、マスクと手袋のみの装着であった。その後当院の周辺地域管轄の保健所に確認をしたところ、患者家族および葬儀関係者の感染の報告はなかった。

考察

SFTS のヒトからヒトへの感染は中国や韓国から複数報告²⁾されているが、本例は国内で初めてのヒト-ヒト感染事例となる。SFTS 患者の診療における医療現場での个人防护具使用については、粘膜を保護するマスクやアイガードに加えて、血液や体液で汚染されやすい手指や体幹前面には、二重手袋とエプロンの装着が推奨されている⁴⁾。さらに、心肺蘇生術や気管挿管などエアロゾルの発生し得る行為に際しては、N95 マスクの装着が望ましい。本件の聞き取り調査からは、患者から医師への感染が成立した機会として2つの可能性があげられた。第1は初診救急外来にてサージカルマスクのみ装着して行った診察時であり、第2は死後処置時である。とくに死後処置時には、医師Aは一重手袋、ガウン、サージカルマスクは装着していたが、アイガードは使用していなかった。中心静脈カテーテルの抜去や縫合処置は、直接ではないにしても血液に曝露される機会であった。結膜からの飛沫感染、あるいは个人防护具を外す際に血液に接触した可能性も考えられた。

今後、本例のようなヒト-ヒト感染を予防するためには、SFTS の診療の手引きに準じ⁴⁾、標準予防策および経路別予防策をさらに徹底すべきである。特に、本症例のような重症患者であれば、中心静脈カテーテル挿入や止血処置などの、観血的手技・処置を実施する可能性がある。そのような処置で血液が飛散する可能性がある場合は、目の防護（フェイスシールドやアイガードなど）も行うなど、感染予防対策を徹底するように医療従事者への注意喚起が必要である。また、SFTS クラスタ感染を検討した報告では遺体の血液との接触はより感染リスクが高いとの報告もある⁵⁾。死後処置においても血液が飛散する可能性がある場合は、同様の感染対策を行うことが必要である。

参考文献

- 1) Kobayashi Y, *et al.*, Emerg Infect Dis 26: 692-699, 2020
- 2) Fang X, *et al.*, PLoS Negl Trop Dis 15: e0009037, 2021
- 3) Takahashi T, *et al.*, J Infect Dis 209: 816-827, 2014
- 4) 加藤康幸, 重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) 診療の手引き改訂新版 2019 年
- 5) Chen Q, *et al.*, Infect Dis Poverty 11: 93, 2022

JA 山口厚生連周東総合病院

消化器内科 清時 秀

研修医 黒高遼太郎

感染対策室 田中宏壮

山口大学医学部附属病院

第三内科 徳永良洋

感染研ウイルス第一部

下島昌幸

吉河智城

海老原秀喜

重症熱性血小板減少症候群 (SFTS)

診療の手引き

改訂新版

2019

CONTENTS

1 重症熱性血小板減少症候群（SFTS）とは 3

2 診 断 5

3 治 療 11

4 院内感染防止 15

5 退院と経過観察 18

SFTS に関する診療の相談が可能な医療機関等 19

参考資料 20

執 筆

加藤康幸（国際医療福祉大学医学部・国立国際医療研究センター）

協力者

西條政幸（国立感染症研究所ウイルス第一部）

忽那賢志（国立国際医療研究センター国際感染症センター）

倭 正也（りんくう総合医療センター感染症センター）

前田 健（山口大学共同獣医学部）

* 本手引きは平成 27 年度日本医療研究開発機構感染症実用化研究事業（新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業）SFTS の制圧に向けた総合的研究の成果として作成された資料に最新の情報を加えて改訂したものである。

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）とは

重症熱性血小板減少症候群（severe fever with thrombocytopenia syndrome）は、2011年に中国の研究者によって初めて報告された新規のSFTSウイルス（陰性一本鎖RNAウイルス）による新興感染症である。

本疾患は東アジア（中国・韓国・日本）に分布するマダニ媒介性ウイルス性出血熱に分類され、致死率が高いこと、重症例では出血症状が認められること、発症した人や動物の血液・体液に接触した者が感染すること、などの特徴がある。

マダニ媒介性ウイルス性出血熱のうち、SFTSは患者発生数が最も多いクリミア・コンゴ出血熱（CCHF）に病態、臨床像が類似していると考えられる。SFTSにおいて明らかになっていない治療法、感染防止策などについてはCCHFのそれを参考に本手引きをまとめた。


医療従事者は患者の血液・体液に曝露する可能性が高いため、職業感染のリスクがある。医療従事者は本疾患を正しく理解し、感染防止策を適切に行いながら、患者の診療ケアを行うことが重要である。

表1 感染症法により届出が必要なマダニ媒介性ウイルス性出血熱

	クリミア・コンゴ出血熱（CCHF）	重症熱性血小板減少症候群（SFTS）	オムスク出血熱（OHF）	キャサナル森林病（KFD）
病原体	ナイロウイルス科	フェヌイウイルス科	フラビウイルス科	
	クリミア・コンゴ出血熱ウイルス	SFTSウイルス	オムスク出血熱ウイルス	キャサナル森林病ウイルス
常在地	アフリカ～ユーラシア	東アジア	ロシアシベリア西部	インド南部
宿主動物	家畜	家畜 野生動物	マスクラット	げっ歯類・サル
媒介する主なマダニ属	<i>Hyalomma</i> イボマダニ	<i>Haemaphysalis</i> チマダニ <i>Amblyomma</i> キラマダニ	<i>Dermacentor</i> カクマダニ	<i>Haemaphysalis</i> チマダニ <i>Ixodes</i> マダニ
感染症法による疾病分類	一類	四類		
感染症法による病原体分類	一種	三種		

図1 SFTS ウイルスのヒトへの感染経路

SFTS ウイルスは、成ダニから幼ダニへ伝播する経卵性ルートとマダニの吸血によるマダニ - 哺乳動物ルートにより自然環境中に維持されている。マダニは SFTS ウイルスのベクターであると同時にレザボアともなっている。



日本において、SFTS の患者は 2013 年 1 月に初めて報告されたが、後方視的研究により、日本国内では 2005 年には患者がすでに発生していたと考えられる。また、分子系統樹解析によれば、国内で分離されたほとんどの SFTS ウイルス株は中国で分離されるウイルス株と異なり、長期間日本国内の自然環境で維持されてきたと考えられる。近年、マダニ - 哺乳動物によるウイルスの感染環がヒトの生活圏に拡大してきた可能性が指摘されている。

SFTS ウイルスに感染したイヌにおいて体液にウイルスが検出されること、また、発熱、衰弱を認めたネコに咬まれた後に感染して死亡した患者も報告されたため、2017 年 7 月に厚生労働省から注意喚起が発出された。特にネコの SFTS ウイルスに対する感受性は高いと考えられる。これらの伴侶動物からの感染リスクはこれまで考えられていた以上に高い可能性があるが、不明の点が多い。

患者や遺体との接触によるヒトからヒトへの感染は中国と韓国から報告されている。最終的に死亡した重症患者にケアを行った家族や医療従事者に限られ、血液・体液との直接接接触が感染経路と考えられる。

なお、中国の一部の地域から報告されている家族内感染事例では、回復の見込みがないと判断された重症患者を自宅で看取するという習慣も影響している可能性がある。

SFTS の病原体検査および抗体検査は保険収載されていない。これらは行政検査として地方衛生研究所および国立感染症研究所で行われるため、検査件数に制限のあるのが現状である。SFTS は比較的まれな疾患であるため、疑い患者を曝露歴や臨床像からスクリーニングし、保健所と連携してこれらの検査を行い診断につなげることが求められている。

1 曝露歴

2013年1月に本疾患が日本にも常在していることが明らかにされて以来、患者の発生は西日本に限定されている。都市部での感染はまれで、郊外での感染が多いと推定される。SFTS ウイルスの遺伝子を検出したマダニや抗体陽性動物（シカ、イノシシ）は東北、関東甲信越でもみつかっており、感染リスクがあるのは西日本に限らないと考えられる。ただし、西日本の患者発生地付近ではこれらの動物の抗体陽性率が高いことも知られている。


重要な曝露歴

- マダニ刺咬
- 体調不良の伴侶動物（ネコやイヌなど）との接触
- 患者や遺体との接触



図2 SFTS 症例の推定感染地域（n = 401, 2019年3月27日現在）

国立感染症研究所まとめ



推定感染都道府県	症例数
石川県	2
福井県	2
三重県	7
滋賀県	2
京都府	5
兵庫県	2
和歌山県	18
鳥根県	15
岡山県	7
広島県	34
山口県	36
徳島県	25
香川県	6
愛媛県	26
高知県	34
福岡県	13
佐賀県	6
長崎県	30
熊本県	10
大分県	14
宮崎県	61
鹿児島県	41
沖縄県	1
不明	4

2 臨床像


図3 わが国における SFTS 症例の疫学（2019 年 3 月 27 日現在）

患者の発生時期は夏季に多い傾向を認める。マダニの活動性とヒトの野外活動が増えることに関連があると考えられる。

日本における病原体を保有するマダニはフタトゲチマダニ、タカサゴキラマダニが代表である。マダニの刺咬を自覚している患者は 30 ～ 50% に止まると考えられる。患者の職業は無職に次いで、農業・林業が多い。

患者は高齢者に多く（年齢中央値：74）、50 歳未満の症例はまれである。

a) 2013 年 3 月以降に届けられた SFTS 症例の発症時期（n = 393, 2019 年 3 月 27 日現在）



* 届出対象となる日時以前の発症例 8 例を除く
(SFTS は 2013 年 3 月 4 日に感染症法で全数把握対象疾患である 4 類感染症に指定された)

b) 基本情報（2019 年 3 月 27 日現在）


		生存例	死亡例	合計
報告数		336	65	401
性別	男	161	34	195
	女	175	31	206
年齢	中央値	73 歳	80 歳	74 歳
	～20代	5	0	5
	30代	8	0	8
	40代	10	0	10
	50代	19	3	22
	60代	92	11	103
	70代	101	18	119
	80代	86	29	115
	90代～	15	4	19

* 死亡数は感染症発生動向調査の届出時点での情報であることから、正確な死亡数及び算出される死亡率はより高い可能性がある。また自治体による公表情報とは異なる場合がある。

死亡例はより高齢者に多い（年齢中央値：80）。日本における致死率は感染症発生動向調査によると、年々低下傾向にあるが、詳細な調査では 25 ～ 30% と高いままである。一方、中国では 10% 程度と報告されている。患者発生地付近で実施された血清疫学調査によると、抗体陽性者はまれであるため、SFTS は不顕性感染の少ない疾患と考えられる。

小児の患者はまれで、日本国内では 1 例（5 歳女児）のみ報告されている。高齢者に比べて一般に軽症と考えられる。現在のところ、妊婦症例の報告はない。

図 4 臨床経過



SFTS の潜伏期は 6 ～ 14 日間で発熱，倦怠感，頭痛などの症状で発症することが多い。マダニ刺咬は痂皮を形成しないことも多く，刺咬痕が認められることはむしろ少ない。刺咬部の所属リンパ節（腋窩，鼠径部など）腫大を認めることもある。続いて嘔吐，下痢，腹痛などの消化器症状が認められることが多い。肝脾腫はまれである。血液検査所見では，白血球減少，血小板減少，トランスアミナーゼ高値が認められることが多い。C 反応性蛋白は正常範囲内のことが多い。プロトロンビン時間は基準範囲内で，活性化トロンボプラスチン時間のみ延長することもある。顕微鏡的血尿は，ほとんどの患者で認められる。第 7 病日頃が臓器不全を合併する時期である。ショック，急性呼吸促進症候群，意識障害，腎障害，心筋障害，播種性血管内凝固症候群，血球貪食症候群などの合併が知られている。

リンパ節の病理像は壊死性リンパ節炎の所見を示す。剖検例は限られるが，SFTS ウイルスはマダニ刺咬部の所属リンパ節に局在する場合と全身のリンパ節に分布する場合がある。アポトーシスによるリンパ球減少も認められ，免疫不全も合併していると考えられる。

表 2 SFTS の届出症例の臨床的特徴

IASR 37:41-42, 2016.

	症例数 (%)		
	全体n=170	死亡例n=46	生存例n=124
発熱	168(99)	46(100)	122(98)
頭痛	30(18)	5(11)	25(20)
神経学的症状*	60(35)	27(59)	33(27)
筋肉痛	30(18)	7(15)	23(19)
全身倦怠感	112(66)	33(72)	79(64)
消化器症状			
全体	150(88)	39(85)	111(90)
腹痛	32(19)	9(20)	23(19)
下痢	101(59)	27(59)	74(60)
嘔吐	43(25)	8(17)	35(28)
食欲不振	111(65)	32(70)	79(64)
出血傾向*	39(23)	23(50)	16(13)
紫斑*	24(14)	13(28)	11(9)
消化管出血*	18(11)	11(24)	7(6)
リンパ節腫脹	60(35)	15(33)	45(35)
血液学的所見			
血小板減少	162(95)	46(100)	116(94)
白血球減少	150(88)	44(96)	106(85)

* 死亡例に多い所見 (p<0.05)

(感染症発生動向調査：2016年2月24日現在報告数)

症例を効率的に検出するには、疑い例（suspect）、蓋然性が高い症例（probable）、確定例（confirmed）の症例定義を明確にすることが望ましい。本手引きにおける暫定的な症例定義を示す。

表 3 本手引きにおける SFTS の暫定的な症例定義と対応

	症例定義	対 応
疑い例	①発症前 14 日以内に SFTS 患者がこれまでに報告されている地域に居住または滞在歴があり、発熱（38℃以上）および白血球減少（$<4,000/\mu\text{L}$）と血小板減少（$<100,000/\mu\text{L}$）を認める患者 ② SFTS がこれまでに報告されている地域に居住または滞在歴はないが、発熱（38℃以上）、白血球減少（$<4,000/\mu\text{L}$）、血小板減少（$<100,000/\mu\text{L}$）を伴い、入院治療を要する患者	最寄りの保健所に実験室診断の適応について相談する 自施設に入院させる場合は、感染管理担当者に連絡する
蓋然性が高い症例	上記の①または②に加えて、以下の 1 つ以上がある ・年齢が 50 歳以上 ・発症前 14 日以内にマダニ刺咬歴、または SFTS 患者・発症動物の血液・体液に接触歴がある ・集中治療を要する	最寄りの保健所に実験室診断を依頼する 自施設に入院させる場合は、感染管理担当者に連絡する
確定例	検査によって、診断が確定した患者	最寄りの保健所に届出

表 4 主な鑑別診断

感染症*	それ以外の疾患
感染性下痢症	血管内悪性リンパ腫
肺 炎	血球貪食症候群
髄膜脳炎	血栓性血小板減少性紫斑病
毒素性ショック症候群	全身性エリテマトーデス
リケッチア症（日本紅斑熱、ツツガムシ病）	
顆粒球アナプラズマ症	

* 海外渡航歴のある患者は専門家に相談する。

3 検査診断

表 5 診断確定に必要な検査（すべて行政検査として実施される）

標準方法	標準材料
分離・同定による病原体の検出	血液、咽頭拭い液、尿
PCR 法による病原体の遺伝子の検出	
ELISA 法または蛍光抗体法による抗体の検出 (IgM 抗体の検出またはペア血清による抗体陽転もしくは抗体価の有無の上昇)	血 清
中和試験による抗体の検出 (ペア血清による抗体陽転または抗体価の有無の上昇)	

図 6 行政検査の流れ




図 7 検体・梱包；基本三重梱包の構成

適切な検体

- 血液(血清スピッツに採取、血清分離はしないでよい)
- 尿(スクリータイプの蓋のついた容器)

検査の依頼

- 最寄りの保健所
- 梱包UN規格カテゴリーAを使用するのが望ましい(BSL3相当病原体)



※ゆうパックを利用する際は、ジュラルミンケースを用いた四重梱包にする

4 届 出

SFTS は感染症法による全数把握対象疾患（４類感染症）である。患者を診断した医師は直ちに最寄りの保健所に届け出る。

別記様式 4-15

重症熱性血小板減少症候群（病原体がフレボウイルス属 SFTS ウイルスであるものに限る。） 発生届

都道府県知事（保健所設置市長・特別区長） 殿

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第 1 項（同条第 6 項において準用する場合を含む。）の規定により、以下のとおり届け出る。

報告年月日 令和 年 月 日

医師の氏名

印

（署名又は記名押印のこと）

従事する病院・診療所の名称

上記病院・診療所の所在地（※）

電話番号（※）

（※病院・診療所に従事していない医師にあっては、その住所・電話番号を記載）

1 診断（検案）した者（死体）の種類 ・患者（確定例） ・無症状病原体保有者 ・感染症死亡者の死体 ・感染症死亡疑いの死体					
2 当該者氏名	3 性別 男・女	4 生年月日 年 月 日	5 診断時の年齢（〇歳は月齢） 歳（ か月）	6 当該者職業	
7 当該者住所			電話（ ） —		
8 当該者所在地			電話（ ） —		
9 保護者氏名	10 保護者住所	（9、10は患者が未成年の場合のみ記入） 電話（ ） —			

11 症 状	・発熱 ・神経症状 ・嘔吐 ・血小板減少 ・出血傾向 ・刺し口 ・その他（ ） ・なし	・頭痛 ・腹痛 ・食欲不振 ・白血球減少 ・紫斑	・筋肉痛 ・下痢 ・全身倦怠感 ・リンパ節腫脹 ・消化管出血	18 感染原因・感染経路・感染地域 ①感染原因・感染経路（確定・推定） 1 接触感染（接触した人・物の種類・状況： ） 2 動物・蚊・昆虫等からの感染（動物・蚊・昆虫等の種類・状況： ） 3 針等の鋭利なものの刺入による感染（刺入物の種類・状況： ） 4 輸血・血液製剤（輸血・血液製剤の種類・使用年月・状況： ） 5 その他（ ） ②感染地域（確定・推定） 1 日本国内（ 都道府県 市区町村） 2 国外（ 国 詳細地域 ）
	12 診断方法 ・分離・同定による病原体の検出 検体：血液・その他（ ） ・検体から直接の PCR 法による病原体遺伝子の検出 検体：血液・その他（ ） ・ELISA 法による血清抗体の検出 結果：IgM 抗体 ・ペア血清での抗体陽転・ ペア血清での抗体価の有意上昇 ・蛍光抗体法による血清抗体の検出 結果：IgM 抗体 ・ペア血清での抗体陽転・ ペア血清での抗体価の有意上昇 ・ペア血清での中和抗体の検出 結果：抗体陽転 ・抗体価の有意上昇 ・その他の方法（ ） 検体（ ） 結果（ ）			
13 初診年月日	令和 年 月 日	19 その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために医師が必要と認める事項		
14 診断（検案）年月日	令和 年 月 日			
15 感染したと推定される年月日	令和 年 月 日			
16 発病年月日（*）	令和 年 月 日			
17 死亡年月日（※）	令和 年 月 日			

この届出は診断後直ちに行ってください

（1、3、11、12、18 欄は該当する番号等を○で囲み、4、5、13 から 17 欄は年齢、年月日を記入すること。
（※）欄は、死亡者を検案した場合のみ記入すること。（*）欄は、患者（確定例）を診断した場合のみ記入すること。
11、12 欄は、該当するものすべてを記載すること。）

治 療

SFTS は感染症法による 4 類感染症であり、患者に対する感染症指定医療機関への入院勧告は行われない。集中治療が提供可能で院内感染防止体制の整った医療機関で治療が行われることが望ましい。

SFTS 患者に対して有効性が確立している抗ウイルス薬は現時点で存在しない。敗血症の治療に準じた支持療法を導入することが予後の改善に重要である。重症患者では行政検査の結果を待たずに抗菌薬の投与を開始する。とくにリケッチア症（日本紅斑熱、ツツガムシ病）の常在地では、テトラサイクリン系抗菌薬を併用することが望ましい。主な症状の管理を示した。

表 6 主な症状の管理

発 熱	アセトアミノフェンを投与する	出血傾向を増悪させる可能性があるため、アスピリンや非ステロイド性抗炎症薬は避ける
頭痛，筋肉痛	同 上	同 上
悪心・嘔吐	制吐剤の投与，点滴治療	
下 痢	ロペラミドの投与，点滴治療	
息切れ， 呼吸困難	酸素投与・必要に応じ人工呼吸	
消化管出血	輸血療法	DIC の評価を行う
意識障害	気道確保	脳症の合併を評価する

重症例に対して、血漿交換、ステロイドおよび G-CSF 投与、持続的血液濾過透析などが行われた報告があるが、効果は不明である。

合併症

1 血球貪食症候群

成人における血球貪食症候群（HHS）はウイルス感染症が誘因となるものが多い。SFTS においても HHS の合併が報告されている。HHS では CRP 高値、脾腫を認めることが多いが、SFTS の経過中にこれらを認めることはまれである。なお、日本は HHS の症例報告が多いことで世界的に知られている。SFTS に合併した HHS は患者数の多い中国からの報告はまれである。

表 7 血球貪食症候群の診断基準（HLH-2004）

下記の 5 つ以上が当てはまるもの	備 考
発熱 $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$	
脾 腫	
2 系統以上の血球減少	好中球 $<1,000/\mu\text{L}$, 血小板 $<100,000/\mu\text{L}$, Hb $<8.0\text{ g/dL}$
中性脂肪高値、フィブリノゲン低値	TG $>1,000\text{ mg/dL}$, Fibrinogen $<150\text{ mg/dL}$
網内系組織における血球貪食像	
ナチュラルキラー細胞の活性低下・消失	
フェリチン $>500\text{ ng/mL}$	
可溶性 CD25 高値	

治療は敗血症に準じた支持療法が中心となるが、特異的な治療として、ステロイドパルス療法、ガンマグロブリン大量療法が試みられることがある。

2 脳 症

SFTS ウイルスの中枢神経指向性は高くないと考えられるため、意識障害はサイトカインストームによる急性脳症と考えられる。MRI による脳の画像所見の報告はほとんど認められない。意識障害は予後不良因子だが、回復した場合の中枢神経後遺症はまれと考えられる。

3 細菌および真菌感染症

日本および中国から侵襲性アスペルギルス症の合併が報告されている。致死率が高いため、呼吸不全を認める場合には同症の合併を疑う。また、入院時の血液培養から細菌が検出された症例も報告されている。このため、重症患者では広域スペクトラムの抗菌薬をエンピリックに投与することが望ましい。

4 出血傾向

消化管出血（急性胃粘膜障害）、血痰、針刺入部の紫斑などの報告が多い。急性硬膜下出血を合併した症例が報告されている。

5 急性腎障害

経過中に急性腎障害を認めた症例も報告されている。複数の研究により、死亡との関連が示唆されている。腎代替療法が行われた症例の報告は限られている。

6 心機能障害・心筋炎

経過中に心機能障害を合併した症例が報告されている。多くは敗血症に伴う臓器障害と考えられるが、心筋炎を起こす場合もある。

7 横紋筋融解症

横紋筋融解症を合併した症例も報告されている。発症機序は不明である。

急性血液浄化療法による SFTS 重症例の管理（りんくう総合医療センター）

60 歳代 女性

意識障害、出血傾向を合併、発症 11 日目に転院

【ブラッドアクセスの確保】

・ICU 内の個室にて、PPE を着用した医師 3 人によりエコーガイド下にて HD 用ブラッドアクセスを右大腿静脈より注意深く挿入した。

【持続的腎代替療法】

・導入のタイミングは敗血症性ショック症例における急性腎障害と同様に無尿を呈した場合とした。

・施行条件として、ヘモフィルターはサイトカイン吸着型の AN69ST 膜（膜面積 1.5m²）、抗凝固剤はナファモスタットを使用した。また、血液流量 80 ～ 100mL/min、透析液流量 300 ～ 360mL/h、補液流量 300 ～ 360mL/h など通常の敗血症性ショック症例における急性腎障害と同様に施行した。

・看護師 1 名が管理し、アラーム発生時や回路交換時には臨床工学技士 1 名が対応した。

・ヘモフィルターは開始から 4.5 日後に初回の交換を行った。凝固障害の改善に伴って、2 回目の交換は 2 日後、3 回目の交換は 1 日後に行った。回路交換は個室で行った。カテーテル交換は不要であった。



・離脱のタイミングは自尿の回復、腎機能、電解質異常、アシドーシスの改善などをみて決定した。合計 9 日間施行し、ICU から退室することができた。転院 28 日目に独歩退院した。

【廃液中のウイルス】

・透析廃液中の SFTS ウイルスを連日測定したところ、4 日目のサンプルのみ陽性となった。なお、患者退室後に 24 力所の環境サンプルを採取したが SFTS ウイルスは検出されなかった。

抗ウイルス療法

リバビリンとファビピラビルが SFTS ウイルス感染マウスにおいて有効性が示されている。ファビピラビルはリバビリンより有効性が高い薬剤と考えられる。リバビリンは中国において広く使用された時期があったが、少なくとも低用量（500 mg/日）では致死率を下げないと考えられる。現時点で SFTS の患者に対してリバビリンを適応外使用することは推奨されない。なお、2016 年度から日本国内で SFTS 患者に対するファビピラビルの有効性と安全性を評価する臨床試験（国立研究開発法人日本医療研究開発機構「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」）が開始された（2019 年 3 月現在、中断中）。また、2018 年度からは企業主導治験（Japic CTI-183872）も開始されている。

致死的な SFTS ウイルスの感染に対する T-705（ファビピラビル）の効果

Tani H, et al: mSphere 1 : e00061-15, 2016.

SFTS ウイルス（SFTSV）は新興出血熱である SFTS の病原体である。この疾患は致死率が高く、中国、韓国、日本に常在している。現時点で SFTS に対する有効な治療法がないため、有効で安全な抗ウイルス薬が SFTS の治療において求められている。ペロ細胞における SFTSV の増殖に対して T-705（ファビピラビル）の抑制効果が検証された。1 型インターフェロン受容体を欠損した（IFNAR-/-）マウスが *in vivo* の SFTSV 感染症の致死モデルとして利用された。日本において抗インフルエンザ薬として承認されている T-705 は *in vitro* および *in vivo* で SFTSV の増殖を抑制する。T-705 はペロ細胞における SFTSV の増殖を 5 log 単

位抑制し、50% 抑制濃度（IC50）および IC90 はそれぞれ 6.0 μ M、22 μ M であった。致死的な SFTSV に感染させた IFNAR-/- マウスに対する T-705 の 5 日間腹腔内または経口投与は体重減少を伴わずに顕著に生存率を改善し（100% 生存）、血清のウイルス量を減少させた。リバビリンも SFTSV の増殖を抑制した。しかし、*in vitro* および *in vivo* において、T-705 より効果は低かった。曝露後時間別薬物投与試験は IFNAR-/- マウスにおける SFTSV 感染症の治療に T-705 が有効であることを明らかにした。これらの結果は T-705 が SFTS の治療における有望な候補であることを示唆する。

中国における重症熱性血小板減少症候群により入院した患者の致死率とリバビリンの効果

Liu W, et al: Clin Infect Dis 57:1292-1299, 2013.

背景

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の広範囲な分布と高い致死率は公衆衛生上の問題となっている。本研究は、SFTS 患者における予後因子を特定し、抗ウイルス療法の効果を評価するために計画された。

方法

2011～12 年に中国で最多の SFTS 患者が治療を受けた信陽市の総合病院において横断研究が行われた。治療効果の一次アウトカムは死亡とし、入院中の血小板数およびウイルス量の推移とリバビリン開始から血小板数正常化までに要した期間をその他のアウトカムとした。

結果

311 名の SFTS 患者が対象となった。最もよく観察された臨

床症状は、発熱、脱力、筋肉痛、消化器症状だった。すべての患者に血小板減少、白血球減少、あるいは両者を認めた。致死率は 17.4%（95% CI, 13.1-21.6%）だった。

高齢（OR, 1.061; 95% CI, 1.023-1.099; $P = 0.01$ ）、意識障害（OR, 5.397; 95% CI, 2.660-10.948; $P < 0.01$ ）、LDH 高値（ > 1200 U/L; OR, 2.620; 95% CI, 1.073-6.399; $P = .035$ ）、CK 高値（ > 800 U/L; OR, 2.328; 95% CI, 1.129-4.800; $P = .022$ ）が死亡と関連していた。リバビリン投与群*と非投与群で致死率は同様であった。死亡例および生存例において、入院中の血小板数やウイルス量にリバビリンによる治療の影響を認めなかった。

*リバビリン使用量は 500mg/日・7 日間

結論

今回得られた所見は、SFTS 患者における死亡例の特徴や抗ウイルス薬に関する知見を改めるだろう。

院内感染防止

SFTS の院内感染は中国と韓国から少なくとも 5 事例報告されており、すべて患者から医療従事者への感染である。いずれも患者の血液・体液に直接接触したことによるものと考えられる。血液のほかに尿、便、呼吸器分泌物からも SFTS ウイルスが検出されている。血液・体液で汚染された環境や呼吸器飛沫から感染することも否定できないため、ウイルス量が高いと予想される重症患者の診療ケアにおいては、接触および飛沫予防策も実施すべきである。

なお、SFTS ウイルスはエンベロープをもつ RNA ウイルスであり、熱、乾燥、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムに消毒効果を認める。


表 8 感染防止策

		感染防止策を実施する期間
疑い例	標準予防策	
蓋然性が高い症例	標準予防策（状況に応じ、アイガード）・飛沫予防策・接触予防策・空気予防策（エアロゾル発生手技）	実験室診断の結果、SFTS が否定されるまで
確定例		症状消失まで（14 日間程度） 血中ウイルス陰性を実験室診断で確認することが望ましい

* さらに心肺蘇生術などのエアロゾル発生を伴う処置を実施する場合には、空気予防策を実施することが望ましい。

図 8 職業感染事例（中国・山東省／2010 年）

Gai, et al: Clin Infect Dis 54:249-252, 2012.



[Clin Infect Dis 2012;54:249-252]

1 個人防護具

重症患者の診療ケアにおける個人防護具は、粘膜を保護するマスクやアイガード（ゴーグル、フェイスシールド）のほか、血液・体液で汚染されやすい手指、体幹前面に対して、それぞれ二重手袋、エプロンの追加が重要と考えられる。中国と韓国から報告された医療従事者の感染事例においてもアイガードの不使用が指摘されており、結膜からの感染が否定できない。また、心肺蘇生術や気管挿管などを行う場合にはエアロゾルによる感染も否定できない。エアロゾル発生手技を行う際には N95 マスクを着用することが望ましい。



図 9 職業感染事例（韓国・ソウル／2014 年）

Kim, et al: Clin Infect Dis 60:1681-1683, 2015.

9 月 4 日意識障害のため入院。入院 9 時間後に痙攣・呼吸停止のため心肺蘇生術（CPR）が実施されるも、入院 12 時間後に死亡。患者に接触した医療従事者 27 名のうち、CPR に関わった 7 名中 4 名が発症（下の表を参照）。なお、CPR に関わった医療従事者 20 名のうち、不顕性感染を 1 名に認めた。

	看護師 1	看護師 2	医師 1	医師 2
潜伏期（日）	5	12	7	9
マスク	あり	あり	あり	あり
手袋	なし	なし	あり	あり
フェイスシールド （ゴーグル）	なし	なし	なし	なし

2 臨床検査

患者の病状を適切に評価するうえで血液・尿検査はきわめて重要である。一方、患者の血液・尿は SFTS ウイルスを高濃度に含む可能性があるため、慎重な取り扱いを要する。

表 9 臨床検査のポイント

- ・臨床検体の前処理（遠心分離など）はエアロゾル発生リスクがあるため、個人防護具を着用した検査技師により安全キャビネット内で実施することが望ましい。
- ・閉鎖式の血球計算測定器は通常通り使用できる。
- ・放射線検査および生理検査は病室内で実施されることが望ましいが、出血、嘔吐、下痢などの症状がなく、検査室の環境を汚染する可能性が低い場合はこの限りではない。
- ・臨床検体および検査に使用した器具は適切に廃棄または消毒を行う。

曝露後発症防止

図 10 患者血液・体液曝露時の対応



1 死後のケア

死亡直後の遺体は、感染性のある SFTS ウイルスを高濃度に含む可能性があるため、慎重な取り扱いを要する。

- ・遺体の体腔から血液・体液が漏出しないよう綿などで処理する。
- ・血液・体液の漏出が高度の場合には、非透過性納体袋の中に遺体を入れる。
- ・遺族および葬儀業者には血液・体液に感染性があることを伝える。
- ・病理解剖は適切な感染防止策を実践しながら行われる必要がある（必要に応じて国立感染症研究所感染病理部に相談する）。
- ・エンバーミングは実施しない。

* 平木 翼，米澤 傑：SFTS virus 感染に伴う重症熱性血小板減少症候群患者の病理解剖を施行して。日本病理学会 http://pathology.or.jp/news/pdf/SFTS_virus-130711.pdf

退院と経過観察

症状がほぼ消失し、患者が自宅での生活が送れるようになれば退院として良い。退院にあたり病原体消失の確認は必要とされていない。

SFTS は急性発熱性疾患ととらえられているが、臨床像は十分に解明されたとは言えない。CCHF においても回復後に不定愁訴（頭痛、倦怠感、関節痛、脱毛、抑うつなど）が長期に続く症例のあることがわかっている。SFTS についても今後の症例の蓄積が重要である。

表 10 診断・治療・院内感染防止における今後の課題

- ・病原体診断の普及と軽症例の検出
- ・血中ウイルス量の経時的変化と予後との相関
- ・各種体液におけるウイルス量の変化とその残存期間
- ・重症患者の適切な全身管理方法
- ・細菌・真菌感染症の合併頻度
- ・治療および曝露後発症予防におけるファビピラビルの有効性と安全性の評価
- ・意識障害・血球貪食症候群合併例におけるステロイドのリスクとベネフィット
- ・回復後に長期に持続する症状や所見の評価

SFTS に関する診療の相談が可能な医療機関等 (2019 年 3 月 27 日現在)

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 (AMED)
平成28年度「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」
重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) に対する診断・治療・予防法の開発
及びヒトへの感染リスクの解明等に関する研究 (研究代表者 西條 政幸,
連絡先 電話03-4582-2660; e-mail: msaijo@nih.go.jp)

都道府県	医療(研究)機関	診療科等
東京都	国立感染症研究所	ウイルス第一部
	国立国際医療研究センター	国際感染症センター
富山県	富山大学附属病院	感染症科
和歌山県	紀南病院	内科
三重県	伊勢赤十字病院	感染症内科
岡山県	岡山大学病院	総合内科
広島県	県立広島病院	総合診療科
	広島大学病院	感染症科
山口県	山口県立総合医療センター	血液内科
	国立関門医療センター	内科
香川県	香川大学医学部附属病院	血液内科
	高松赤十字病院	血液内科
	三豊総合病院	内科
愛媛県	愛媛大学医学部附属病院	第一内科
	愛媛県立中央病院	総合診療科
	松山赤十字病院	内科
	市立八幡浜総合病院	内科
	市立宇和島病院	血液内科
徳島県	徳島大学病院	呼吸器・膠原病内科
	徳島県立中央病院	呼吸器内科
	東徳島医療センター	内科
高知県	幡多けんみん病院	内科
	近森病院	感染症内科
	高知医療センター	救急科
福岡県	九州大学病院	グローバル感染症センター
	北九州市立医療センター	総合診療科
	福岡赤十字病院	感染症内科
長崎県	長崎大学病院	感染制御教育センター
	佐世保市総合医療センター	呼吸器内科
	長崎労災病院	感染症内科
	諫早総合病院	呼吸器内科
	北松中央病院	呼吸器内科
大分県	大分大学医学部附属病院	呼吸器内科, 感染症内科, アレルギー内科
熊本県	熊本大学医学部附属病院	血液内科
	熊本医療センター	血液内科
	熊本市民病院	呼吸器内科
	熊本赤十字病院	内科
宮崎県	宮崎大学医学部附属病院	膠原病感染症内科
	宮崎県立宮崎病院	リウマチ膠原病・感染症内科
	宮崎県立延岡病院	内科
鹿児島県	鹿児島大学病院	血液・膠原病内科
	鹿児島市立病院	神経内科

◆ 参考資料 ◆

◇厚生労働省からの情報◇

- ・〈特集〉重症熱性血小板減少症候群（SFTS），2016年2月現在，病原微生物検出情報（JASR）37，2016.
- ・重症熱性血小板減少症候群（SFTS）検査のための検体及びその処理法等に関するお願い（検査依頼マニュアル）国立感染症研究所ウイルス第一部
- ・重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に関する Q & A

◇主要論文◇

- ・ Yu X, et al: Fever with thrombocytopenia associated with a novel bunyavirus in China. *N Engl J Med* 364:1523-1532, 2011.
- ・ Gai ZT, et al: Clinical progress and risk factors for death in severe fever with thrombocytopenia syndrome patients. *J Infect Dis* 206:1095-1102, 2012.
- ・ Takahashi T, et al: The first identification and retrospective study of severe fever with thrombocytopenia syndrome in Japan. *J Infect Dis* 209:816-827, 2014.
- ・ Hiraki T, et al: Two autopsy cases of severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS) in Japan: a pathognomonic histological feature and unique complication of SFTS. *Pathol Int* 64:569-575, 2014.
- ・ Liu Q, et al: Severe fever with thrombocytopenia syndrome: an emerging tick-borne zoonosis. *Lancet Infect Dis* 14:763-772, 2014.
- ・ Hiraki T, et al: Two autopsy cases of severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS) in Japan: a pathognomonic histological feature and unique complication of SFTS. *Pathol Int* 64:569-575, 2014.
- ・ Tani H, et al: Efficacy of T-705 (Favipiravir) in the treatment of infections with lethal severe fever with thrombocytopenia syndrome virus. *mSphere* 1:e00061-15, 2016.
- ・ Sylvas JA, et al: The emergence of severe fever with thrombocytopenia syndrome virus. *Am J Trop Med Hyg* 97: 992-996, 2017.
- ・ Saijo M. Pathophysiology of severe fever with thrombocytopenia syndrome and development of specific antiviral therapy. *J Infect Chemother* 24:773-781, 2018.

〔合併症〕

- ・ Kaneyuki S, et al: Ulcerative lesions with hemorrhage in a patient with severe fever with thrombocytopenia syndrome observed via upper gastrointestinal endoscopy. *Jpn J Infect Dis* 69:525-527, 2016.
- ・ Yoo J, et al: Spontaneous acute subdural hemorrhage in a patient with a tick borne bunyavirus-induced severe fever with thrombocytopenia syndrome. *Korean J Neurotrauma* 13:57-60, 2017.
- ・ Kim MG, et al: Severe fever with thrombocytopenia syndrome presenting with rhabdomyolysis. *Infect Chemother* 49:68-71, 2017.
- ・ Nakano A, et al: Hemophagocytic lymphohistiocytosis in a fatal case of severe fever with thrombocytopenia syndrome. *Intern Med* 56:1597-1602, 2017.
- ・ Nakamura S, et al: Steroid pulse therapy in patients with encephalopathy associated with severe fever with thrombocytopenia syndrome. *J Infect Chemother* 24:389-392, 2018.
- ・ Kaneko M, et al: A patient with severe fever with thrombocytopenia syndrome and hemophagocytic lymphohistiocytosis-associated involvement of the central nervous system. *J Infect Chemother* 24:292-297, 2018.
- ・ Chen X, et al: Clinical features of fatal severe fever with thrombocytopenia syndrome that is complicated by invasive pulmonary aspergillosis. *J Infect Chemother* 24:422-427, 2018.
- ・ Miyamoto S, et al: Fulminant myocarditis associated with severe fever with thrombocytopenia syndrome: a case report. *BMC Infect Dis* 19:266, 2019.

〔院内感染防止〕

- ・ Bao C, et al: A family cluster of infections by a newly recognized bunyavirus in Eastern China, 2007: Further evidence of person-to-person transmission. *Clin Infect Dis* 53:1208-1214, 2011.
- ・ Gai Z, et al: Person-to-person transmission of severe fever with thrombocytopenia syndrome bunyavirus through blood contact. *Clin Infect Dis* 54:249-252, 2012.
- ・ Kim WY, et al: Nosocomial transmission of severe fever with thrombocytopenia syndrome in Korea. *Clin Infect Dis* 60:1681-1683, 2015.
- ・ Pshenichnaya NY, Nenadskaya SA. Probable Crimean-Congo hemorrhagic fever virus transmission occurred after aerosol-generating medical procedures in Russia: nosocomial cluster. *Int J Infect Dis* 33:120-122, 2015.
- ・ Park SY, et al: Needle-stick injury caused by a patient with severe fever with thrombocytopenia syndrome in Korea. *Infect Cont Hosp Epi* 37:368, 2016.
- ・ Ergönül O, et al: Systematic review and meta-analysis of postexposure prophylaxis for Crimean-Congo hemorrhagic fever virus among healthcare workers. *Emerg Infect Dis* 24:1642-1648, 2018.
- ・ Moon J, et al: Aerosol transmission of severe fever with thrombocytopenia syndrome virus during resuscitation. *Infect Control Hosp Epidemiol* 40:238-241, 2019.

平成 30 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金
新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
一類感染症等の患者発生時に備えた臨床的対応に関する研究
研究代表者 加藤 康幸（国際医療福祉大学医学部）

